

UC-II
Colágeno tipo II

**Novo tratamento
para a osteoartrite!**

Osteoartrite é uma doença das articulações caracterizada por degeneração das cartilagens acompanhada de alterações das estruturas ósseas vizinhas.

As articulações das mãos, joelhos, coxofemorais e da coluna são as mais atingidas.

UC-II® age na causa da dor articular. Ajuda o corpo a restaurar e reconstruir a cartilagem, aumentando a mobilidade e flexibilidade das articulações.

UC-II® tem ação rápida e a longo prazo para promover a saúde das articulações.

Posologia: 40 mg por dia.

*Estudo Clínico Randomizado, duplo-cego, aplicado em 52 indivíduos com duração de 90 dias. Dose de **UC-II®**: 40 mg, dose de Glucosamina: 1500 mg, dose de Condroitina: 1200 mg. Resultados obtidos em 0, 30, 60 e 90 dias. Estudo apresentado na reunião anual do "American College of Nutrition", em outubro de 2008.



Manipulare
Farmácia de Manipulação

www.pharmanostra.com.br/blog
facebook.com/pharmanostra
[@pharmanostra](https://twitter.com/pharmanostra) | [@PnSaudeBeleza](https://twitter.com/PnSaudeBeleza) | [@PnEsportes](https://twitter.com/PnEsportes)
youtube.com/pharmanostra



pharmanostra
Sintonia com o futuro

A qualidade do nosso trabalho é a garantia da sua saúde